

REVISTA MEXICANA DE MASTOZOLOGÍA

VOLUMEN 10 - 2006



Asociación Mexicana de Mastozoología, A.C.



REGISTROS NOTABLES DE MURCIÉLAGOS EN EL ESTADO DE OAXACA, MEXICO

JOSÉ L. GARCÍA-GARCÍA, ANA M. ALFARO E. Y ANTONIO SANTOS-MORENO

*Laboratorio de Ecología Animal. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional, Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Oaxaca, C. P. 71230.
asantosm90@hotmail.com*

Abstract: The range of five species of bats (*Enchisthenes hartii*, *Anoura geoffroyi*, *Hylonycteris underwoodi*, *Rhogeessa tumida* and *Myotis californica*) is extended from new records for localities in the districts of Choapam and Juchitán, Oaxaca, Mexico, of specimens collected in 2004 and 2005.

Keywords: Chiroptera, bat record, Oaxaca, range extension.

Palabras clave: Chiroptera, registros de murciélagos, Oaxaca, distribución.

El estado de Oaxaca, en el sureste de México, es una entidad sobresaliente por su riqueza de especies en varios grupos animales, incluidos los mamíferos, de los que hasta la fecha se ha documentado la presencia de 192 especies (Alfaro *et al.*, 2005), distribuidas en siete familias (Briones-Salas y Sánchez-Cordero, 2004). En este número destacan los murciélagos que representan el 60.87% de las 138 especies registradas en el país (Ceballos *et al.*, 2002). A pesar de esta notable riqueza, aún existen zonas muy amplias por inventariar en el Estado, por lo que la distribución de las especies dentro de la entidad aún es incompleta. El objetivo de este trabajo es presentar información adicional sobre la distribución de algunas especies de murciélagos en los distritos de Choapam y Juchitán. Se consideró como registro notable cuando la nueva localidad se localiza en un distrito en el que previamente no se tenía conocimiento de la presencia de la especie. En todos los casos los ejemplares se capturaron con redes de niebla colocadas cerca de fuentes de agua, senderos hechos por humanos o animales dentro de la vegetación. La determinación de la especie se realizó con claves de Álvarez *et al.* (1994) y Medellín *et al.* (1997). De cada organismo capturado se muestran las medidas corporales convencionales: longitud total, de la cola vertebral, de la pata derecha y de la oreja (mm) y el peso (grs). Asimismo se muestran también algunas medidas craneales, también en mm: longitud mayor del cráneo (LOMC), longitud condilobasal (LOCB), anchura de la caja craneal (ANCC), anchura interorbital posterior (ANINPO), longitud de la hilera maxilar de dientes (LOHMD) y longitud palatal (LOPA) (De Blase y Martín, 1979). Los números de catálogo que se mencionan son los del preparador (AS-M).

***Enchisthenes hartii* (Thomas, 1892)**

El 8 de mayo de 2005 se colectó una hembra (número de catálogo 444). Medidas somáticas: 64, 0, 11, 15 y 12 g de peso. Medidas craneales LOMC 10.10, LOCB 10.56, ANCC 9.21, ANINPO 4.42, LOHMD 6.32 y LOPA 8.67. El sitio de colecta fue 4.6 km S Ejido Plan de San Luís (17° 44' 43.9" N y 95° 56' 27.4" W), Municipio de Jocotepec, Distrito de Choapam, a una altitud de 106 m, en la zona conocida como la Chinantla baja. La vegetación es selva mediana. La localidad conocida más cercana se ubica en el Distrito de Juchitan, Sierra Madre, al norte de Zanatepec (Goodwin, 1969). No se pudo georreferenciar el registro histórico debido a su ambigüedad. Se estima que el aumento en el área de distribución en el estado es poco más de 200 km. Esta especie se encuentra incluida en la Norma Oficial Mexicana en la categoría de Protección especial. Otras especies registradas en la localidad fueron *Balantiopteryx plicata*, *Glossophaga soricina*, *Artibeus jamaicensis*, *Centurio senex* y *Sturnira lilium*.

***Anoura geoffroyi* Gray, 1838**

El 18 de julio de 2004 se colectó un macho con testículos escrotados (número de catálogo 232). Sus medidas somáticas: 62, 0, 9, 12 y 16 g de peso. Medidas craneales LOMC 24.5, LOCB 10.16, ANCC 9.50, ANINPO 4.89, LOHMD 9.33 y LOPA 13.45. La localidad de colecta es 0.8 km E Benito Juárez (16° 42' 45.4" N y 94° 8' 23.1" W), Municipio de San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán, a 930 m de altitud, en la zona de los Chimalapas. En el sitio la vegetación predominante es bosque de pino-encino. La localidad más cercana de ocurrencia de la especie es San Gabriel Mixtepec, Sola de Vega (Goodwin, 1969). La nueva localidad representa una extensión de 315 km en el área de distribución. Las otras especies registradas fueron *Sturnira lilium*, *S. ludovici*, *Artibeus jamaicensis*, *A. intermedius* y *Carollia perspicillata*.

***Hylonycteris underwoodi* Thomas, 1903**

El 25 de enero 2005 se colectó un macho (número de catálogo 327). Sus medidas somáticas son 62, 7, 9, 8 y 10 g de peso. Medidas craneales LOMC 21.42, LOCB 8.60, ANCC 8.34, ANINPO 3.76, LOHMD 7.81 y LOPA 13.33. La localidad de colecta es 6 km NW Benito Juárez (16° 44' 20" N y 94° 11' 45" W), Municipio de San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán, 1700 m de altitud. El tipo de vegetación es un ecotono de bosque mesófilo de montaña y selva alta. La localidad más cercana previamente conocida es San José Chacalapa en el distrito de Yautepec (Goodwin, 1969). La nueva localidad representa una ampliación de 208 km para el área de distribución en el Estado. Otras especies registradas fueron *Glossophaga soricina*, *Dermanura tolteca*, *Uroderma bilobatum*, *Artibeus jamaicensis*, *Sturnira lilium*, *Carollia sowelli* y *Eptesicus brasiliensis*.

Este último ejemplar representa también el primer registro de la especie para el estado de Oaxaca (García-García *et al.*, enviado).

***Rhogeessa tumida* H. Allen, 1866**

El 28 de octubre de 2004 se colectó una hembra (numero de catalogo 274), con medidas somáticas: 76, 30, 5, 11 y 7 g de peso. Medidas craneales: LOMC 13.47, LOCB 6.90, ANCC 6.03, ANINPO 3.79, LOHMD 5.00 y LOPA 6.58. La localidad de colecta es 0.8 km E Benito Juárez (16° 42' 45.4"N y 94° 8' 23.1"W), Municipio de San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán, a 930 m de altitud. La vegetación predominante es bosque de pino-encino. La localidad más cercana previamente conocida es el municipio de Tehuantepec, en el distrito de Tehuantepec (Goodwin, 1969). La nueva localidad representa una ampliación de 124 km. Otras especies registradas fueron *Carollia sowelli*, *Glossophaga soricina* y *Dermanura tolteca*.

***Myotis californica* (Audubon & Bachean, 1842)**

El 21 de enero de 2005 se colectó una hembra (número de catalogo 321). Medidas somáticas: 41, 39, 5, 10 y 5 g de peso. Medidas craneales: LOMC 13.07, LOCB 6.77, ANCC 6.28, ANINPO 3.62, LOHMD 5.19 y LOPA 6.70. La localidad de colecta es 0.8 km E Benito Juárez (16° 42' 45.4"N y 94° 8' 23.1"W), Municipio de San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán, a 930 m de altitud. La vegetación predominante es bosque de pino-encino. La localidad más cercana previamente conocida es Santo Domingo Chontecomatlán, en el municipio de Santa María Ecatepec en el distrito de Yautepec (Goodwin, 1969). La nueva localidad representa una ampliación de 207 km del área de distribución. Otras especies registradas fueron *Glossophaga soricina*, *Tadarida brasiliensis* y *Uroderma bilobatum*.

AGRADECIMIENTOS

A la asociación Ecoprodes S. C. por invitar a los autores a participar en el proyecto de biodiversidad desarrollado en el distrito de Tuxtepec y a las autoridades del municipio de San Miguel Chimalapa. A la Coordinación General de Estudios de Posgrados e Investigación (CGPI) del Instituto Politécnico Nacional por el apoyo económico.

LITERATURA CITADA

Alfaro, A.M., J.L. García-García y A. Santos-Moreno. 2005. The false vampire bat *Vampyrum spectrum* in Oaxaca, México. *Bat Research News*, 46:145-146.

- Álvarez, T., S.T. Álvarez-Castañeda y J.C. López Vidal. 1994. *Claves para murciélagos mexicanos*. Instituto Politécnico Nacional. México.
- Briones-Salas, M. y V. Sánchez-Cordero. 2004. Mamíferos. Pp. 423-447, en: *Biodiversidad de Oaxaca* (A. J. García Mendoza, M. J. Ordóñez y M. Briones-Salas eds. y coords.), Instituto de Biología, UNAM-Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza-Wold Wildlife Found. México.
- Ceballos, G., J. Arroyo-Cabrales y R.A. Medellín. 2002. The mammals of México: composition, distribution, and conservation. *Occasional Papers The Museum Texas Tech University*, 218:1-27.
- De Blase, A.F. y R.E. Martín. 1979. *Manual of Mammalogy, Anatomy and Natural History*. W. M. C. Brown Co. Publishers.
- García-García, J.L., A. Santos-Moreno y A. Ma. Alfaro . en prensa. First record of *Eptesicus brasiliensis* in Oaxaca, México. *Bat Research News*.
- Goodwin, G. 1969. Mammals from the State of Oaxaca, Mexico in the American Museum of Natural History. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 141:1-269.
- Medellín, R.A., H.T. Aríta y O. Sánchez. 1997. *Guía de identificación de los murciélagos de México*. Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad. México.

REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA

VOLUMEN 10

2006

ÍNDICE

- 4 Editorial. La colecta e inventario de mamíferos.** Eric Mellick.
- 6 Obituario. Bernardo Villa-Ramírez.** Rodrigo A. Medellín y Joaquín Arroyo-Cabrales.
- 10 Bibliografía selecta del Dr. Bernardo Villa.** José Ramírez-Pulido, Rodrigo A. Medellín y Joaquín Arroyo-Cabrales.

ARTÍCULOS

- 14 Matías Martínez-Coronel, Carolina Müdespacher Ziehl y Salvador Gaona.** Análisis morfométrico de *Peromyscus difficilis felipensis* (Rodentia: Muridae).
- 29 Martín Pérez Lustre, Rusby Guadalupe Contreras Díaz y Antonio Santos-Moreno.** Mamíferos del bosque mesófilo de montaña del Municipio de San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca, México.
- 41 Iván Lira Torres.** Abundancia, densidad, preferencia de hábitat y uso local de los vertebrados en la Tuza de Monroy, Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

NOTAS

- 67 Andrew M. Burton y Gerardo Ceballos.** Northern-most record of the collared anteater (*Tamandua mexicana*) from the Pacific slope of Mexico.

Continúa al reverso de la contraportada...

- 71 Ma. Antonieta Casariego-Madorell, Rurik List y Gerardo Ceballos.**
Aspectos básicos sobre la ecología de la nutria de río (*Lontra longicaudis annectens*) para la costa de Oaxaca.
- 75 Jorge Bolaños, Eduardo Naranjo, Griselda Escalona y Consuelo Lorenzo.**
Eumops underwoodii (Chiroptera: Molossidae) en Campeche.
- 80 M. Cristina Macswiney G., Beatriz Bolívar C., Frank M. Clarke y Paul A. Racey.** Nuevos registros de *Pteronotus personatus* y *Cynomops mexicanus* (Chiroptera) en el estado de Yucatán, México.
- 88 José L. García-García, A. M. Alfaro E. y A. Santos-Moreno.** Registros notables de los murciélagos en el estado de Oaxaca, México.
- 92 Andrew M. Burton.** Puma abundance on the Colima Volcanic Complex.
- 100 Ciervo**
- 108 Noticias**
- 117 Revisores del Volumen 10**